

ZAŠTITA KUKURUZA

VРЕМЕ ПРИМЕНЕ	РАЗЛОГ ТРЕТИРАЊА
Pre setve ili istovremeno sa setvom	Suzbijanje zemljišnih štetočina (<i>Elateridae</i>)
Posle setve, a pre nicanja	Jednogodišnji travni i širokolisni korovi
Faza 3–5 listova	Širokolisni korovi
Faza 3–7 listova	Širokolisni i uskolistni korovi
Faza do 8 listova	Širokolisni i uskolistni korovi
Početak metličenja	Kukuruzni plamenac (<i>Ostrinia nubilalis</i>)

IZBOR PREPARATA

FAZA

Saturn Ultra 5–10 kg/ha



Telus 1,4 -1,5 l/ha +
Zeazin 1,5-2 l/ha

Maton 0,5–0,7 l/ha ili
Colosseum 0,5–0,7 l/ha
samostalno ili u kombinaciji sa
Zeazin 1-1,3 l/ha
(ako **Zeazin** nije korišćen posle setve,
a pre nicanja)



Tvister 2-2,3 l/ha +
Nikosav 1,25 l/ha ili
Stahofen 60 g/ha



Intermezzo 0,15-0,25 l/ha +
Nikosav 1,25 l/ha



a.m. deltametrin 0,5 l/ha
+
a.m. hlorantraniliprol 0,1-0,15 l/ha

