

ZAŠTITA PŠENICE

VREME PRIMENE

RAZLOG TRETIRANJA

Pre setve

Bolesti pšenice

Od sredine bokorenja
do početka vlatanja

Divlji ovas
(*Avena fatua*)

Prvi tretman

Širokolisni korovi na površinama gde je prisutna prilepača (*Galium sp.*)

Od sredine bokorenja
do drugog kolenca

Bolesti pšenice

Folijarna prihrana

ili

Širokolisni korovi (na površinama gde nije prisutna prilepača (*Galium sp.*))

Od sredine bokorenja
do drugog kolenca

Bolesti pšenice

Folijarna prihrana

ili

Širokolisni korovi na površinama gde su prisutni poponac i divlja kupina (*Convolvulus arvensis* *Rubus ceasius*)

Od sredine bokorenja
do pojave lista zastavičara

Bolesti pšenice

Primeniti jednu od tri
varijante u zavisnosti od
korova na parceli

Folijarna prihrana

Žitna pijavica
(*Lema melanopus*)

Na početku formiranja
prvih kolonija

Početak cvetanja

Fusarium sp.

Folijarna prihrana, povećanje kvaliteta i
sadržaja proteina

Posle žetve
(Avgust – Septembar)

Širokolisni i uskolisni korovi

IZBOR PREPARATA

FAZE

Seedmax 25 FS 200 ml/100 kg semena



Amanet 1,2 l/ha
ili
Istok 0,6 l/ha + **ES plus** 0,2 l/ha



Futur 50 g/ha +
ES plus 0,2 l/ha

Image 0,7 l/ha ili **Teatar plus** 0,8 l/ha

Wuxal® Super 3 l/ha

Tribufen 20 g/ha +
ES plus 0,2 l/ha

Image 0,7 l/ha ili
Teatar plus 0,8 l/ha

Wuxal® Super 3 l/ha

Disident 10 g +
Strabon 1 l/ha +
ES plus 0,2 l/ha

Image 0,7 l/ha

Wuxal® Super 3 l/ha



Plures 0,3-0,5 l/ha ili
Bifenicus C 0,1-0,125 l/ha



Unify 0,8-1 l/ha ili
Postulat 0,8-1 l/ha

Wuxal® Microplant 2 l/ha ili
Wuxal® Grano 2 l/ha

Glifosav 480 5 l/ha

